



گزینه دو

مؤسسه آموزشی فرهنگی

دانلود از سایت ریاضی سرا

هندسه ۲

(فصل ۲)


www.riazisara.ir

دایره:

دایره، مکان هندسی نقاطی از یک صفحه است که فاصله آنها از نقطه‌ی ثابتی واقع در آن صفحه، مقدار ثابتی باشد. نقطه‌ی ثابت، مرکز دایره و مقدار ثابت شعاع دایره نامیده می‌شود. دایره به مرکز O و شعاع R را با $C(O, R)$ نشان می‌دهند. بر دو نقطه‌ی متمایز بیشمار دایره می‌گذرد. مکان هندسی مرکز دایره‌ها، عمود منصف پاره خطی است که این دو نقطه را به هم وصل می‌کند. بر سه نقطه‌ی غیر واقع بر یک خط راست یک دایره و فقط یک دایره می‌گذرد که مرکزش محل تلاقی عمود منصف دو به دوی پاره خطها می‌باشد.

کمان:


دو نقطه‌ی A و B را بر روی دایره در نظر بگیرید. این دو نقطه محیط دایره را به دو قسمت کوچک و بزرگ تقسیم می‌کنند که هر کدام از آنها را یک کمان می‌نامند. (در حالتی که دو نقطه دو سر دو قطر باشند، دو قسمت برابرند.)



$$\widehat{AEB} = \widehat{AFB}$$


زاویه‌ی مرکزی:

زاویه‌ای که رأس آن مرکز دایره و هر ضلع آن شعاع دایره باشد، زاویه‌ی مرکزی نامیده می‌شود. بنابه قرارداد، اندازه‌ی کمان نظیر هر زاویه‌ی مرکزی در دایره، همان اندازه‌ی زاویه‌ی مرکزی روبروی آن کمان در نظر گرفته می‌شود.




وتر:

پاره خطی است که دو نقطه‌ی متمایز از محیط یک دایره را بهم وصل می‌کند و وترى که از مرکز دایره بگذرد قطر نامیده می‌شود. که بزرگترین وتر هر دایره است.



نکات:

قضیه: در هر دایره قطر عمود بر هر وتر آن وتر و کمانهای نظیر آن وتر را نصف می‌کند و خطی که مرکز دایره را به وسط یک وتر از آن دایره وصل می‌کند، بر آن وتر عمود است. خطی که مرکز دایره را به وسط کمان نظیر یک وتر از آن دایره وصل می‌کند بر آن وتر عمود است و بالعکس.



$$\widehat{AE} = \widehat{EB}$$

$$AH = HB$$

مثال: در دایره‌ی $C(O, 5)$ مکان هندسی وسط وترهایی به طول ۸، دایره‌ای به کدام شعاع است؟


$$3 \quad (4)$$

$$\sqrt{5} \quad (3)$$

$$2\sqrt{2} \quad (2)$$

$$4 \quad (1)$$

حل:




$$BH = \frac{AB}{2} = 4$$

$$OB^2 - BH^2 = OH^2 \Rightarrow OH = 3 = R'$$

قضیه: در یک دایره، کمانهای نظیر دو وتر مساوی با هم برابرند و بالعکس.

$$AB = CD \Leftrightarrow \widehat{AB} = \widehat{CD}$$




مثال: در شکل زیر دو وتر مساوی و متقاطع AB و CD در دایره مفروضند. در این صورت:

- (۱) $AD = BC$ (۲) $MD = MB$ (۳) $\hat{D}BC = \hat{A}DB$ (۴) همه‌ی موارد صحیح است.

حل:

داریم:




$$AB = CD \Rightarrow \widehat{AB} = \widehat{CD}$$

$$\widehat{AD} + \widehat{DB} = \widehat{DB} + \widehat{BC} \Rightarrow \widehat{AD} = \widehat{BC} \quad (\text{گزینه ۱})$$

زوایای ABC و ADC هر دو رو به کمان AC می‌باشند لذا با هم برابرند. همینطور زوایای ACD و BAC با هم برابرند، لذا مثلثهای ADM, MBC با هم برابرند. پس:


$$\left. \begin{array}{l} \hat{A}BD = \hat{C}DB \\ \hat{A}BC = \hat{C}DA \end{array} \right\} \Rightarrow \hat{D}BC = \hat{A}DB \quad (\text{گزینه ۳})$$

$MD = MB \Rightarrow$ (گزینه ۲)



قضیه: در هر دایره، وترهای مساوی، از مرکز دایره به یک فاصله‌اند و بالعکس: $AB = A'B' \Leftrightarrow OH = OH'$


قضیه: در یک دایره، از دو وتر نابرابر، آن که بزرگتر است به مرکز دایره نزدیکتر است و بالعکس:



$$L > L' \Leftrightarrow d' > d$$

زاویه‌ی محاطی:

زاویه‌ای که رأسش روی دایره و ضلعهایش دو وتر از دایره باشند، زاویه‌ی محاطی نامیده می‌شود. کمائی از دایره را که به دو ضلع زاویه‌ی محاطی محدود و در داخل زاویه واقع است، کمان روبرو به آن زاویه می‌نامند.




$$\hat{B}AC = \frac{\widehat{BC}}{2}$$

قضیه: اندازه‌ی هر زاویه‌ی محاطی برابر نصف کمان روبروی آن است:

مثال: دو دایره متساوی در نقاط A و D متقاطعند. از نقطه D قاطع BC را نسبت به دو دایره رسم می‌کنیم. مثلث ABC

همواره:



(۲) قائم الزاویه است.

(۴) متساوی الاضلاع است.

(۱) متساوی الساقین است.

(۳) قائم الزاویه‌ی متساوی الساقین است.

حل:

زوایای محاطی \hat{B} و \hat{C} روبرو به دو کمان مساویند لذا مساویند.

مثال: مثلث متساوی‌الاضلاعی را داخل نیم‌دایره‌ای به شعاع R طوری محاط کرده‌ایم که یک ضلع مثلث روی قطر نیم‌دایره قرار گرفته است. کمترین محیط برای این مثلث بر حسب R کدام است؟

$$2\sqrt{3}R \quad (۴)$$

$$2\sqrt{2}R \quad (۳)$$

$$3R \quad (۲)$$

$$2R \quad (۱)$$

حل:

هرچه مثلث به سمت سر قطر حرکت می‌کند، ارتفاع آن کاهش می‌یابد. حداقل محیط مربوط به وقتی است که یک رأس مثلث سر قطر قرار گیرد که در این صورت سر دیگر روی مرکز دایره واقع می‌شود. لذا ضلع مثلث برابر شعاع دایره خواهد بود. لذا کمترین محیط $2R$ است.



مثال: در متوازی الاضلاع ABCD دایره‌ی محیطی مثلث ACD امتداد ضلع BC را در نقطه‌ی M قطع کرده است. مثلث

ABM کدام نوع است؟


(۴) قائم الزاویه

(۳) متساوی الاضلاع

(۲) متساوی الساقین

(۱) متشابه ACD

حل:



$$\left. \begin{array}{l} \hat{M} = \hat{D} = \frac{AC}{2} \\ \hat{D} = \hat{B} \end{array} \right\} \Rightarrow \hat{M} = \hat{B} \text{ پس مثلث متساوی الساقین است.}$$

مثال: در مثلث ABC، داریم $\hat{B} = 50^\circ$ و $\hat{C} = 60^\circ$. نیمساز داخلی زاویه‌ی A و عمود منصف ضلع BC در نقطه‌ی M

مقاطعند، زاویه‌ی MBC چند درجه است؟


(۴) ۴۰

(۳) ۳۵

(۲) ۳۰

(۱) ۲۵


حل: گزینه ۳ پاسخ است.



دایره‌ی محیطی مثلث ABC را رسم می‌کنیم. نیمساز زاویه‌ی A کمان BC را نصف می‌کند. عمود منصف ضلع BC هم کمان BC را نصف می‌کند، پس نقطه‌ی برخورد نیمساز زاویه‌ی A و عمود منصف ضلع BC (نقطه‌ی M) روی دایره‌ی محیطی مثلث ABC قرار دارد. بنابراین زاویه‌ی MBC برابر نصف کمان مقابلش است.

$$\hat{MBC} = \frac{\widehat{MC}}{2} = \hat{CAM} = 35^\circ$$

قضیه: در هر دایره کمان‌های محصور بین دو وتر موازی با هم برابرند و بالعکس.



$$AB \parallel CD \Leftrightarrow BD = AC$$

مثال: در مثلث ABC می‌دانیم: $\hat{A} + \hat{C} = 150^\circ$. اگر $AC \parallel BD$ باشد. در مورد این مثلث کدام گزینه صحیح است؟


(۲) این مثلث قائم الزاویه است.

(۱) این مثلث متساوی الاضلاع می‌باشد.

(۴) این مثلث مختلف الاضلاع است.

(۳) این مثلث متساوی الساقین است.

حل:




$$\left. \begin{array}{l} \hat{C} = \hat{B} \Rightarrow \widehat{CD} = \widehat{AB} \\ \hat{A} = \frac{\widehat{CDB}}{2} = \frac{\widehat{CD} + \widehat{BD}}{2} \\ \hat{C} = \frac{\widehat{AB}}{2} = \frac{\widehat{CD}}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \hat{A} - \hat{C} = \frac{\widehat{BD}}{2} = 90^\circ \\ \hat{A} + \hat{C} = 150^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \hat{A} = 120^\circ \\ \hat{C} = 30^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow \hat{B}_1 = 30^\circ \Rightarrow \text{مثلث متساوی الساقین است}$$

زاویه‌ی ظلی:


زاویه‌ای که رأسش روی دایره است و یک ضلعش دایره را قطع می‌کند و ضلع دیگرش بر دایره مماس است زاویه‌ی ظلی نامیده می‌شود.

قضیه: اندازه هر زاویه ظلی برابر با نصف کمان روبروی آن است.



$$\hat{BAC} = \frac{AB}{2}$$

مثال: در شکل روبرو $AB = AC$ و CT مماس بر دایره در نقطه C و $\angle AC = 140^\circ$ می باشد. اندازهی زاویهی \widehat{BCT} کدام است؟



۲۰ (۴)

۴۰ (۳)

۶۰ (۲)


۸۰ (۱)

حل:

$$AB = AC \Rightarrow \widehat{AB} = \widehat{AC} = 140^\circ \Rightarrow \widehat{BC} = 80^\circ \Rightarrow \widehat{BCT} = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ$$

زاویهی بین دو وتر:

زاویهی ای که از برخورد دو وتر در یک دایره ایجاد می شود برابر نصف مجموع اندازهی دو کمانی است که به ضلعها و امتداد ضلع های آن زاویه محدودند.



$$\widehat{AMB} = \frac{\widehat{AB} + \widehat{A'B'}}{2}$$

مثال: در شکل مقابل O مرکز دایره و $\widehat{A} = 65^\circ$ و $\widehat{B} = 35^\circ$ زاویه C چند درجه است؟


۶۳ (۴)

۶۲ (۳)

۶۱ (۲)


۶۰ (۱)

حل:



$$\left. \begin{aligned} \widehat{A} = \frac{\widehat{TB}}{2} = 65^\circ &\Rightarrow \widehat{TB} = 130^\circ \Rightarrow \widehat{BD} = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ \\ \widehat{B} = \frac{\widehat{AT}}{2} = 35^\circ &\Rightarrow \widehat{AT} = 70^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \widehat{C} = \frac{\widehat{AT} + \widehat{DB}}{2} = \frac{50^\circ + 70^\circ}{2} = 60^\circ$$

مثال: در شکل زیر M وسط کمان EF است و $\widehat{BC} = 50^\circ$ اندازهی $\widehat{B} + \widehat{D}$ چند درجه است؟



۱۶۰ (۱)

۱۷۵ (۲)

۱۸۰ (۳)


۲۳۰ (۴)

حل:

$$\left. \begin{aligned} \widehat{B} &= \frac{\widehat{CF} + \widehat{FM}}{2} \\ \widehat{D} &= \frac{\widehat{BC} + \widehat{BE} + \widehat{FM}}{2} \\ \widehat{FM} &= \widehat{EM} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \widehat{B} + \widehat{D} = \frac{\widehat{CF} + \widehat{FM} + \widehat{BC} + \widehat{BE} + \widehat{FM}}{2} = \frac{\widehat{CF} + \widehat{FM} + \widehat{BC} + \widehat{BE} + \widehat{EM}}{2} = \frac{360^\circ}{2} = 180^\circ$$


زاویهی بین امتداد دو وتر:

امتداد وترهای AA' و BB' از دایره (C) در نقطهی M یکدیگر را قطع کرده اند. اندازهی زاویهی ای که از برخورد امتداد دو وتر از یک دایره پدید می آید، برابر قدر مطلق نصف تفاضل اندازهی کمانهایی از آن دایره است که به اضلاع آن زاویه محدود است:



$$\widehat{AMB} = \frac{|\widehat{AB} - \widehat{A'B'}|}{2}$$

در حالت خاص اگر دو وتر به دو مماس هم‌مرس تبدیل شود، داریم:



$$\widehat{TMT'} = \frac{\widehat{TET'} - \widehat{TFT'}}{2}$$

مثال: در شکل مقابل اندازه‌ی کمان‌های x و y کدام است؟


۸۰,۷۰ (۴)

۶۰,۱۰۰ (۳)

۵۰,۱۰۰ (۲)


۱۰۰,۸۰ (۱)

حل:



$$\left. \begin{aligned} 80 &= \frac{x+y}{2} \Rightarrow x+y=160 \\ 20 &= \frac{x-y}{2} \Rightarrow x-y=40 \end{aligned} \right\} \Rightarrow x=100^\circ \quad y=60^\circ$$

مثال: در شکل روبرو $2x-3y$ کدام است؟



۸۰ (۱)

۱۰۰ (۲)

۱۲۰ (۳)

۱۴۰ (۴)

حل: گزینه ۳ پاسخ است.


$$\left. \begin{aligned} x+y &= 360^\circ \\ \frac{x-y}{2} &= 60^\circ \Rightarrow x-y=120^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2x=480^\circ \Rightarrow x=240^\circ \Rightarrow y=120^\circ$$

$$2x-3y=480-360=120$$

پس:

چند ضلعی مماطی:

اگر همه‌ی رأس‌های یک چندضلعی روی یک دایره قرار داشته باشند، چندضلعی را محاطی یا محاط در دایره می‌نامند.



شرط لازم و کافی برای آن که یک چهارضلعی محاطی باشد این است که مجموع زوایای مقابل آن 180° باشد.

عمودمنصف‌های اضلاع چهارضلعی محاطی در یک نقطه هم‌رسند که همان مرکز دایره محیطی آن است.

نکته: مربع، مستطیل و دوزنقه متساوی الساقین محاطی‌اند.

مثال: از نقطه‌ی M وسط کمان EF از یک دایره دو وتر MA و MB را رسم می‌کنیم به گونه‌ای که وتر EF را در نقاط

D, C قطع کند. چهارضلعی ABCD همواره:


(۴) محاطی است.

(۳) محیطی است.

(۲) دوزنقه است.

(۱) لوزی است.

حل:



$$\left. \begin{aligned} \hat{A} &= \frac{MF+FB}{2} \\ \hat{C}_1 &= \frac{EM+FB}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{A} = \hat{C}_1$$


$$\hat{C}_1 + \hat{C}_2 = 180^\circ \Rightarrow \hat{A} + \hat{C}_2 = 180^\circ$$

چهارضلعی محاطی است.

مثال: چهارضلعی حاصل از تقاطع نیمسازهای زوایای خارجی یک چهارضلعی محدب همواره

- (۱) یک دوزنقه است.
 (۲) یک چهارضلعی محاطی است.
 (۳) یک چهارضلعی محیطی است.
 (۴) هیچکدام

✓حل:



$$\hat{M} + \hat{P} = 180^\circ - \hat{A}_1 - \hat{D}_1 + 180^\circ - \hat{B}_1 - \hat{C}_1 = 360^\circ - (\hat{A}_1 + \hat{B}_1 + \hat{C}_1 + \hat{D}_1)$$

مجموع زوایای خارجی n ضلعی محدب 360° است. چون این زوایا نیمساز زوایای خارجی هستند پس:


$$\hat{A}_1 + \hat{B}_1 + \hat{C}_1 + \hat{D}_1 = \frac{360^\circ}{2} = 180^\circ \Rightarrow \hat{M} + \hat{P} = 360^\circ - 180^\circ = 180^\circ$$

لذا چهارضلعی محاطی است.

محیط و مساحت دایره:

مساحت دایره‌ای به شعاع R برابر است با: πR^2

مساحت قطاع دایره با زاویه α (بر حسب رادیان) به این ترتیب بدست می‌آید:




$$\left. \begin{matrix} 2\pi & \pi R^2 \\ \alpha & S \end{matrix} \right\} \Rightarrow S = \frac{\alpha R^2}{2}$$

$$S' = \frac{1}{2} R^2 (\alpha - \sin \alpha)$$

محیط دایره‌ای به شعاع R برابر است با $2\pi R$ همچنین طول قوس AB در قطاع فوق برابر است با $R\alpha$
 نکته: بین همه‌ی شکل‌های مسطح با محیط ثابت، دایره بیش‌ترین مساحت را دارد. و بین همه شکل‌های با مساحت ثابت، دایره کمترین محیط را دارد.

مثال: در شکل مقابل O مرکز دایره و $\angle AOB = 90^\circ$ است. مساحت قسمت هاشور خورده چیست؟



$$\frac{1}{2} R^2 \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4} R^2 \quad (1)$$

$$\frac{\pi R^2}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} R^2 \quad (4)$$

$$\frac{\pi R^2}{4} - \frac{R^2}{2} \quad (3)$$

✓حل:

$$\alpha = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \Rightarrow S = \frac{R^2}{2} (\alpha - \sin \alpha) = \frac{R^2}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \frac{\pi R^2}{4} - \frac{R^2}{2}$$

مثال: مساحت بخش هاشور خورده کدام است؟ (دایره متساوی می‌باشند)


$$8 \left(2\sqrt{3} - \frac{\pi}{4} \right) \quad (4)$$

$$8 \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{4} \right) \quad (3)$$

$$16 \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{4} \right) \quad (2)$$

$$16 \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \right) \quad (1)$$

✓حل:




مساحت یکی از دایره $\times \frac{1}{6} \times 3 -$ مساحت مثلث $OO'O'' =$ مساحت مطلوب

مثلث $OO'O''$ متساوی الاضلاع است و طول ضلع آن $a = 2R = 8$ می‌باشد.

$$S = \frac{64 \times \sqrt{3}}{4} - \frac{1}{3} \times \pi \times 16 = 16 \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \right)$$


وضع دو دایره نسبت به هم:

دو دایره می توانند متقاطع، مماس بیرون، متخارج، متداخل و مماس درون باشند. در حالت خاص، دو دایره متداخل می توانند هم مرکز باشند:




۲- دو دایره ی مماس بیرون:

$$d = R + R'$$




۱- دو دایره ی متخارج (بیرون هم):

$$d > R + R'$$



۴- دو دایره ی مماس درون:

$$d = |R - R'|$$




۳- دو دایره ی متقاطع:

$$|R - R'| < d < R + R'$$


۶- دو دایره ی هم مرکز (حالت خاص دو دایره متداخل):

$$d = 0$$



۵- دو دایره ی متداخل (درون هم):

$$d < |R - R'|$$



مثال: دو دایره $C(O, 5)$ و $C(O', 3)$ که در آن $OO' = 7$ می باشد، چه وضعی نسبت به هم دارند؟

(۱) متداخلند (۲) متقاطعند (۳) متخارجند (۴) مماس درونی اند

حل:

$$|R - R'| < OO' = d < R + R' \Rightarrow \text{دو دایره متقاطعند}$$

$$2 < 7 < 8$$

مثال: دو دایره ی به شعاع های ۱ و ۲ هم مرکزند. مکان هندسی مرکز دایره ای که بر آن ها مماس باشد، کدام است؟

(۱) دو دایره به شعاع های $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{2}$ (۲) دو دایره به شعاع های $\frac{1}{4}$ و $\frac{3}{4}$

(۳) دایره ای به شعاع $\frac{3}{2}$ (۴) دایره ای به شعاع $\frac{1}{2}$

حل: گزینه ی ۱ صحیح است.

در حالت اول دایره ی متحرک بر دایره ی بزرگتر مماس داخل و بر دایره ی کوچکتر مماس خارج است.

لذا شعاع دایره ی متحرک را یکبار بر اساس شعاع دایره ی بزرگتر و بار دیگر بر اساس شعاع دایره ی

کوچکتر بازنویسی می کنیم و دو عبارت را برابر قرار می دهیم:

$$R_2 - X = X - R_1 \rightarrow X = \frac{R_1 + R_2}{2} = \frac{3}{2}$$



لذا چون فاصله از مرکز ثابت است، مکان مراکز دایره متحرک دایره ایست به همان مرکز و شعاع X

در حالت دوم دایره ی متحرک بر هر دو دایره ی مماس داخل است.

لذا شعاع دایره ی متحرک را یکبار بر اساس شعاع دایره ی بزرگتر و بار دیگر بر اساس شعاع دایره ی


کوچکتر بازنویسی می کنیم و دو عبارت را برابر قرار می دهیم:

$$R_2 - X = X + R_1 \rightarrow X = \frac{R_2 - R_1}{2} = \frac{1}{2}$$



رابطه‌های طولی در دایره:

۱- وتر مینیمم: از نقطه مفروض M در داخل دایره بی‌شمار وتر می‌گذرد، که کوچک‌ترین آن‌ها بر OM عمود است و آن را وتر مینیمم نقطه M می‌نامند. و بزرگ‌ترین آن‌ها از O و M می‌گذرد که قطری از دایره است.



وتر مینیمم AB

وتر ماکزیمم CD

مثال: نقطه A به فاصله $\frac{R}{2}$ از مرکز دایره $C(O, R)$ قرار دارد. نسبت اندازه‌ی وتر مینیمم به اندازه‌ی وتر ماکزیمم گذرا بر نقطه A کدام است؟


$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (4)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (3)$$

$$\frac{2}{3} \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$


حل:



$$MN = 2 \left(\sqrt{R^2 - \frac{R^2}{4}} \right) = R\sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad \frac{MN}{PQ} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$PQ = 2R$$

۲- بیشترین و کمترین فاصله از دایره: بیشترین فاصله هر نقطه بیرون دایره از یک دایره برابر فاصله آن نقطه از سر قطری از دایره است که امتداد آن از نقطه مورد نظر در بیرون دایره می‌گذرد و کمترین فاصله مربوط به فاصله نقطه مورد نظر از سر دیگر قطر فوق می‌باشد.



فاصله نقطه مورد نظر از مرکز دایره L

بیشترین فاصله نقطه‌ی M از نقاط دایره $L + R$

کمترین فاصله نقطه‌ی M از نقاط دایره $L - R$

مثال: دو دایره با شعاع‌های ۹ و ۱۲ واحد مماس درونی‌اند. اندازه‌ی بزرگ‌ترین قطعه‌ی مماسی که یک سر آن بر روی دایره‌ی بزرگ‌تر و سر دیگر آن (نقطه‌ی تماس) بر روی دایره‌ی کوچک‌تر باشد، کدام است؟


$$8 \quad (4)$$

$$12 \quad (3)$$

$$8 \quad (2)$$

$$9 \quad (1)$$

حل:




چون $AT^2 = AO^2 - R^2$ پس هر چه AO بزرگتر باشد، AT بزرگتر است. ماکزیمم AO هنگامی است که A روی امتداد قطر گذرنده از O قرار بگیرد:

$$AT^2 = 15^2 - 9^2 = 12^2 \rightarrow AT = 12$$


۳- روابط بین طول وترها: از نقطه‌ی M واقع در داخل دایره (C) دو وتر دلخواه AA' و BB' رسم شده‌اند. در این صورت داریم:

$$MA \cdot MA' = MB \cdot MB'$$




و اگر دو پاره‌خط AA' و BB' در نقطه‌ی M طوری یکدیگر را قطع کنند که: $MA \cdot MA' = MB \cdot MB'$ آنگاه چهار نقطه A و A' و B و B' روی یک دایره‌اند.

نکته: اگر ME و MF کوتاهترین وتر را بسازند:




$$ME^2 = MF^2 = MA \cdot MA' = MB \cdot MB'$$



مشابه همین رابطه اگر امتداد وترهای AA' و BB' از دایره (C) یکدیگر را در نقطه M خارج دایره قطع کنند، خواهیم داشت:

$$MA \cdot MA' = MB \cdot MB'$$



قضیه: اگر از یک نقطه یک مماس و یک قاطع نسبت به دایره رسم کنیم، قطعه‌ای از خط مماس محصور بین آن نقطه و نقطه تماس واسطه‌ی هندسی بین دو قطعه‌ی قاطع است و بالعکس.

$$MT^2 = MA \cdot MA'$$

مثال: سه نقطه C, B, A مانند شکل مقابل روی یک خط قرار دارند. از C, B, A بی‌شمار دایره می‌گذرد. مکان هندسی نقطه‌ی تماس مماسهایی که از نقطه‌ی A بر آن‌ها می‌توان رسم کرد، کدام است؟


(۲) خطی است موازی با AB

(۴) دایره است به مرکز B

(۱) خطی است عمود بر AB

(۳) دایره است به مرکز A


حل:



$$AT^2 = AB \times AC = \text{مقدار ثابت}$$

لذا مکان دایره‌ای است به مرکز A و شعاع AT .

مثال: نقطه‌ی P مرکز نیم‌دایره به قطر CC' است. شعاع PD مماس بر دایره‌ی مفروض رسم شده است. دایره‌ای که بر دو نقطه‌ی A و B می‌گذرد و مماس بر خط Δ است، در کدام نقطه بر خط Δ مماس می‌شود؟



(۱) C یا C'


(۲) بین دو نقطه‌ی C و C'

(۳) خارج پاره‌خط $C'C$

(۴) نشدنی

حل: گزینه ۱ پاسخ است.


اولین موضوعی که در این سؤال جلب توجه می‌کند این است که:



$$PD^2 = PA \cdot PB$$


حال اگر دایره گذرنده از A و B بر خط Δ مماس شود، خواهیم داشت:

$$PM^2 = PA \cdot PB$$




با مقایسه ۲ رابطه فوق خواهیم داشت:

$$PM^2 = PD^2$$



یعنی طول PM با طول PD برابر است اما برای PM ۲ جواب وجود دارد و چون

PD شعاع دایره خط‌چین می‌باشد پس ۲ جواب M نقاط C و C' می‌باشد.



مثال: در شکل مقابل $2x - y$ کدام است؟

حل:


با توجه به روابط طولی در دایره داریم:

$$\left. \begin{aligned} 6^2 &= y \times (y + 4 + x) \\ 2 \times 10 &= 4 \times x \rightarrow x = 5 \end{aligned} \right\} \rightarrow y \times (y + 9) = 36 = 3 \times 12 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow 2x - y = 7$$

کمان در فور یک زاویه:

مکان هندسی رأس زاویه‌ای برابر α که ضلع‌هایش از دو نقطه ثابت می‌گذرند، کمان‌هایی از دو دایره‌ی مساوی است که از آن دو نقطه‌ی

ثابت می‌گذرند و زاویه‌ی مرکزی رو به رو به وتر مشترک آن‌ها برابر 2α است. این کمان، کمان در خور زاویه‌ی α نامیده می‌شود.



نکته ۱: نقاط A و B جزء کمان در خور زاویه‌ی α نیستند.


نکته ۲: کمان در خور زاویه‌ی 90° رو به رو به پاره خط AB، دایره‌ای به قطر AB است.

نکته ۳: کمان \widehat{AMB} و کمان نظیر آن از دایره دوم، کمان در خور نظیر پاره خط AB و زاویه $180^\circ - \alpha$ می‌باشد.

نکته ۴: شعاع دایره‌ای که کمان در خور زاویه‌ی α رو به پاره خط $AB = a$ بخشی از آن است برابر است با:

$$R = \frac{a}{2 \sin \alpha}$$

فاصله مرکز دایره از وتر AB برابر $OH = \frac{a}{2 |\tan \alpha|}$ می‌باشد.



مثال: مثلی با معلومات $\hat{A} = 120^\circ$ و $a = 4\sqrt{3}$ قابل رسم است. h_a کدام عدد نمی‌تواند باشد؟


(۴) ۳

(۳) ۲

(۲) $\sqrt{3}$

(۱) $\sqrt{2}$

حل:



مکان هندسی رأس A ، کمان در خور زاویه‌ی 120° رو به پاره خط $BC = a$ است. ضمن تغییر

مکان A روی کمان، ماکزیمم مقدار ارتفاع، مربوط به حالتی است که A روی انتهای شعاع عمود

بر پاره خط BC قرار بگیرد. (عمود منصف BC) در این حالت

$$h_a = 2\sqrt{3} \cot 60^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 2$$

لذا $h_a \leq 2$ است. لذا h_a برابر ۳

نمی‌تواند باشد.

ترسیم‌های هندسی در دایره:

خطهای قاطع و مماس نسبت به دایره:

خط راستی که دایره را در دو نقطه قطع کند، قاطع نسبت به دایره یا به طور خلاصه قاطع نامیده می‌شود.

خط L که دایره را فقط و فقط در نقطه‌ی A روی دایره قطع می‌کند، خط مماس بر دایره در نقطه‌ی A می‌نامیم. نقطه‌ی A را

نقطه‌ی تماس می‌نامیم.

نکته: از هر نقطه خارج یک دایره می توان دو خط مماس بر آن دایره رسم نمود.

قضیه: اگر دو خط MT و MT' بر دایره $C(O, R)$ مماس باشند، داریم:

۱- $\hat{O}TM = 90^\circ$ (شعاع دایره در نقطه ی تماس بر خط مماس عمود است).

۲- $MT = MT'$

۳- OM نیمساز $\hat{T}OT'$ و $\hat{T}MT'$ است.

۴- OH عمود منصف TT' است.

۵- $OH \cdot OM = R^2$

۶- $TT'^2 = 4OH \cdot HM$

۷- $TT' \cdot OM = 2R \cdot MT$

مثال: از نقطه ی M خارج دایره ی $C(O, R)$ دو مماس بر دایره رسم شده است. اگر پاره خطی که از دو نقطه ی تماس می گذرد،

OM را به دو قسمت به طول های ۲ و ۶ تقسیم کند، طول مماس چقدر است؟


(۴) گزینه ۱ یا ۲ صحیح است.

(۳) ۸

(۲) $\sqrt{48}$

(۱) ۴

حل:



$$OM = OH + HM = 6 + 2 = 8$$

$$R^2 = OH \cdot OM = 8 \times 2 = 16 \Rightarrow R = 4$$


$$MT = \sqrt{OM^2 - R^2} = \sqrt{64 - 16} = \sqrt{48}$$

تا اینجا فرض کرده ایم $MH > OH$ ولی حالتی نیز وجود دارد که $HM < OH$ که در این حالت:

$$R'^2 = OH' \cdot OM = 6 \times 8 = 48 \Rightarrow R' = \sqrt{48}$$

$$MT'^2 = OM^2 - R'^2 = \sqrt{64 - 48} = 4$$

نکته: پاره خط هایی که دایره ی محاطی داخلی مثلث روی اضلاع آن جدا می کند، بر حسب طول اضلاع مثلث چنین است:




$$AH = AK = p - a$$

$$BH = BM = p - b$$

$$CM = CK = p - c$$

پاره خط هایی که دایره ی محاطی خارجی رأس A روی ضلع a و روی امتداد دو ضلع b, c

جدا می کند بر حسب طول اضلاع مثلث چنین است:



$$AH = AK = p$$

$$BH = BM = p - c$$

$$CM = CK = p - b$$

مثال: در شکل مقابل با حرکت نقطه ی M روی محیط دایره و بین نقاط Q, P مساحت و محیط مثلث چگونه اند؟


(۲) مساحت ثابت و محیط متغیر

(۱) مساحت ثابت و محیط ثابت

(۴) مساحت متغیر و محیط متغیر

(۳) مساحت متغیر و محیط ثابت

حل:




$$p = AP = AQ \Rightarrow 2p = 2AP = 2AQ$$

با حرکت M روی محیط دایره طول مماس های AP و AQ ثابت می ماند لذا محیط مثلث ثابت

است. اما ملاحظه می کنیم با نزدیک شدن M به نقاط Q, P مساحت مثلث به صفر میل می کند، لذا

مساحت متغیر است.

مثال: دایره‌ی محاطی داخلی یک مثلث به طول اضلاع ۱۳ و ۹ و ۸، در نقطه‌ی تماس کوچک‌ترین ضلع را به ۲ قطعه تقسیم می‌کند. نسبت آن دو قطعه کدام است؟




$$\frac{2}{3} \quad (4)$$

$$\frac{3}{7} \quad (3)$$

$$\frac{2}{5} \quad (2)$$

$$\frac{1}{3} \quad (1)$$

حل: گزینه ۱ پاسخ است.




$$\left. \begin{array}{l} x+y=8 \\ x+z=9 \\ y+z=13 \end{array} \right\} \oplus \Rightarrow 2(x+y+z)=30 \Rightarrow x+y+z=15$$

$$\frac{x}{y} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad \text{بنابراین } x=2, y=6, z=7 \text{ می‌باشد، در نتیجه:}$$

چند ضلعی ممیطی:

هرگاه همه‌ی ضلع‌های یک چندضلعی بر یک دایره مماس باشند، چند ضلعی را محیطی یا محیط بر دایره می‌نامند. شرط لازم و کافی برای این که یک چهارضلعی محیطی باشد آن است که مجموع دو ضلع مقابل آن مساوی باشد با مجموع دو ضلع دیگر مقابل به هم:



$$AB+CD=BC+AD$$

نیمسازهای داخلی چهارضلعی محیطی در یک نقطه هم‌رسند که همان مرکز دایره‌ی محاطی چهارضلعی است.

مساحت هر چهار ضلعی محیطی با حاصل ضرب محیط آن در نصف شعاع دایره‌ی محاطی برابر است.

$$S = \frac{R}{2} \times 2p$$

نکته: لوزی، مربع و مثلث محیطی‌اند و دوزنقه متساوی‌الساقین ممکن است محیطی باشد.

مثال: یک دوزنقه‌ی متساوی‌الساقین بر دایره‌ای به شعاع $R=3$ محیط است. اگر مساحت دوزنقه ۴۵ واحد مربع باشد، طول ساق آن کدام است؟


$$۸.۵ \quad (4)$$

$$۸ \quad (3)$$

$$۷.۵ \quad (2)$$

$$۷ \quad (1)$$

حل:



$$\frac{(a+b)}{2} \times 6 = 45 \Rightarrow a+b=15$$

$$a+b=x+x=2x=15 \Rightarrow x=7.5$$

مثال: دایره‌ی $C(O, 1/5)$ در یک دوزنقه‌ی قائم‌محاظ است. اگر یک زاویه‌ی دوزنقه 60° باشد، محیط آن برابر کدام است؟


$$(3+2\sqrt{3}) \quad (4)$$

$$3(3+\sqrt{3}) \quad (3)$$

$$2(3+2\sqrt{3}) \quad (2)$$

$$2(3+\sqrt{3}) \quad (1)$$

حل:



$$x^2 = \frac{x^2}{4} + 4R^2 \Rightarrow \frac{3}{4}x^2 = 9 \Rightarrow x = 2\sqrt{3}$$

$$2p = AB + BC + DC + AD = AH_1 + 2\left(\overbrace{BH_1}^x + \overbrace{CH_2}^x\right) + DH_2 + AD = 2(AD + x) = 2(3 + 2\sqrt{3})$$

مثال: سه نیمساز داخلی یک چهارضلعی از یک نقطه می‌گذرند. اگر اندازه‌ی سه ضلع متوالی آن چهارضلعی به ترتیب ۷۲ و ۱۰۷ و ۹۱ باشند، اندازه‌ی ضلع چهارم آن کدام است؟

۱۲۶ (۴)

۹۰ (۳)

۸۸ (۲)


۵۶ (۱)

حـل:


همانطور که گفته شد، یک چهارضلعی را محیطی گویند هرگاه اضلاع آن بر دایره‌ای مماس باشند یا به عبارت دیگر نقطه‌ای درون آن یافت شود که از چهار ضلع به یک فاصله باشد. وقتی نیمساز سه زاویه از یک چهارضلعی در نقطه‌ای هم‌رس باشند نیمساز زاویه‌ی چهارم نیز از آن نقطه عبور خواهد کرد و در نتیجه آن نقطه از تمامی اضلاع به یک فاصله خواهد بود. پس می‌تواند مرکز دایره‌ی محاطی آن چهارضلعی باشد و چهارضلعی مذکور محیطی باشد پس داریم: $a + c = b + d \Rightarrow 163 = 107 + d \Rightarrow d = 56$

مماس مشترک دو دایره:

مماس مشترک دو دایره خطی است که بر هر دو دایره مماس باشد. اگر دو دایره در یک طرف خط مماس باشند، این خط مماس مشترک خارجی و اگر دو دایره در دو طرف خط مماس باشند این خط مماس مشترک داخلی دو دایره نامیده می‌شود. دو دایره‌ی متخارج دارای دو مماس مشترک خارجی AB و $A'B'$ و دو مماس مشترک داخلی CD و $C'D'$ هستند. نقطه‌ی تلاقی مماس مشترک خارجی و نقطه تلاقی مماس مشترک داخلی روی خط المکزین و امتداد آن هستند. و خط المکزین را به یک نسبت تقسیم می‌کنند:



$$\frac{FO'}{FO} = \frac{EO'}{EO} = \frac{R'}{R}$$




$$\left. \begin{aligned} OO'^2 &= OH^2 + O'H^2 \\ d^2 &= (R - R')^2 + TT'^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow TT' = \sqrt{d^2 - (R - R')^2}$$

اندازه‌ی مماس مشترک خارجی دو دایره:

برای بدست آوردن اندازه‌ی مماس مشترک خارجی دو دایره به طریق زیر عمل می‌کنیم:

مثال: دو دایره C و C' به مرکزهای O و O' به شعاع‌های ۳ و ۵ به فاصله‌ی $OO' = 16$ مفروض است، فاصله محل تلاقی

مماس مشترک‌های داخلی و خارجی کدامست؟



۱۰ (۴)

۲۰ (۴)

۳۰ (۲)



۴۰ (۱)

حـل:

$$\left. \begin{aligned} \frac{EO}{EO'} &= \frac{R}{R'} \rightarrow \frac{16 - EO'}{EO'} = \frac{5}{3} \rightarrow EO' = 6 \\ \frac{FO'}{FO} &= \frac{R'}{R} \rightarrow \frac{FO'}{FO' + 16} = \frac{3}{5} \rightarrow FO' = 24 \end{aligned} \right\} \Rightarrow EF = EO' + O'F = 6 + 24 = 30$$

اندازه‌ی مماس مشترک داخلی دو دایره:

برای بدست آوردن مماس مشترک داخلی دو دایره به طریق زیر عمل می‌کنیم:



$$\left. \begin{aligned} TT'^2 + OM^2 &= OO'^2 \\ TT'^2 + (R + R')^2 &= d^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow TT' = \sqrt{d^2 - (R + R')^2}$$

نکته: در دو دایره‌ی مماس بیرون داریم: $TT' = 2\sqrt{RR'} = AA'$

مثال: در شکل مقابل، شعاع دو دایره برابر R می باشد. طول نخ‌ی که دور آن‌ها بسته شده است، چقدر است؟


$$\epsilon \pi R \quad (\epsilon)$$

$$\epsilon R + 2\pi R \quad (\epsilon)$$

$$2(R + \pi R) \quad (\epsilon)$$

$$2R + \pi R \quad (\epsilon)$$

حل:



نخ را به چهار قسمت تقسیم می کنیم: $TAS, T'A'S', SS', TT'$. داریم:

$$TAS = T'A'S' \Rightarrow TT' = SS' \quad \text{مربع است}$$

طول کمان TAS برابر با نصف دایره است. یعنی:

$$|TAS| = \frac{2\pi R}{2} = \pi R$$

و TT' هم برابر با طول خط المکزین دو دایره یعنی $2R$ است. پس:

$$\text{طول نخ} = (\pi R \times 2) + (2R \times 2) = 4R + 2\pi R$$


نکته: اگر زاویه‌ی بین مماسهای مشترک داخلی و یا خارجی α باشد، این مماسها توسط فرمولهای زیر قابل محاسبه اند:

$$AB = A'B' = |R - R'| \cot \frac{\alpha}{2}$$

$$CD = C'D' = (R + R') \cot \frac{\alpha}{2}$$

مثال: دو دایره به شعاعهای ۹ و ۴ مماس بیرون هستند. اگر TT' و EE' و MM' مماس مشترکهای این دواير هستند. طول EE'

چقدر است؟




حل:

$$\left. \begin{aligned} EF = T'E = ET &\rightarrow EF = \frac{TT'}{2} \\ FE' = M'E' = E'M &\rightarrow E'F = \frac{MM'}{2} \end{aligned} \right\} \rightarrow EF = E'F = \frac{TT'}{2}$$

$$TT' = MM' \rightarrow EE' = TT'$$

پس:

$$EE' = TT' = \sqrt{(R+R')^2 - (R-R')^2} = \sqrt{4 \cdot 9 \cdot 9} = 2\sqrt{9 \cdot 9} = 2 \cdot 9 = 18$$



نکته: اگر α زاویه‌ی بین دو مماس مشترک خارجی باشد آنگاه: $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{R - R'}{d}$

و در دو دایره مماس خارج: $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{R - R'}{R + R'}$

و اگر α زاویه‌ی بین دو مماس مشترک داخلی باشد: $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{R + R'}{d}$

مثال: دو دایره به شعاعهای $R, 2R$ مماس خارجند. زاویه‌ی بین خط المکزین و مماس مشترک خارجی آنها برابر کدام است؟

حل:

$$\left. \begin{aligned} d &= 3R \\ 2R - R &= R \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{R}{3R} = \frac{1}{3} \Rightarrow \alpha = \text{Arcsin} \frac{1}{3}$$

مثال: اندازه زاویه‌ی بین دو مماس مشترک داخلی دواير $C(O, 2\sqrt{2}), C'(O', \sqrt{2})$ کدام است؟

حل:

$$\frac{\alpha}{2} = \text{Arcsin} \frac{R + R'}{d} \Rightarrow \alpha = 2 \text{Arcsin} \frac{R + R'}{d} = 2 \text{Arcsin} \frac{\sqrt{2}}{2} = 90^\circ$$