



گزینه دو

مؤسسه آموزشی فرهنگی

دانلود از سایت ریاضی سرا

هندسه ۲

(فصل ۲)


www.riazisara.ir

تبدیلات هندسی

نگاشت:

در ریاضی برای تعریف انواع معینی از تناظرهای بین مجموعه‌ها کلمه‌ی نگاشت به کار می‌رود. نگاشت از D به R ، تناظری بین مجموعه‌های D و R است که در آن هر عضو مجموعه D با یک و تنها یک عضو از مجموعه R متناظر باشد. به عبارت دیگر نگاشت از D به R قاعده‌ای است که به هر عنصر D عنصر مشخص و یکتایی از R را نسبت دهد. طبق این تعریف هر عضو R ممکن است با بیش از یک عضو D متناظر باشد.

مثال: کدامیک یک نگاشت نیست؟



که حل: گزینه ۴ صحیح است.

نگاشت‌ها را معمولاً با حروف بزرگ نشان می‌دهند. نماد $M: D \rightarrow R$ نگاشتی از مجموعه D به مجموعه R را نمایش می‌دهد. اگر A عضوی از مجموعه D و A' عضو نظیر آن در مجموعه R باشد می‌نویسیم: $M(A) = A'$. تصویر A تحت نگاشت M خوانده می‌شود.

هر نقطه صفحه را به صورت زوج مرتب (x, y) نشان می‌دهیم. اگر T یک تبدیل باشد، آنگاه $T(x, y) = (x', y')$ به این معنا است که نقطه (x', y') تصویر نقطه (x, y) تحت تبدیل T است.

مثال: اگر $T(x, y) = (x + 5, 4y)$ آنگاه تحت تبدیل T ، تصویر کدام نقطه است؟

که حل:

$$T(x, y) = (x + 5, 4y) = (4, 12) \Rightarrow \begin{cases} x + 5 = 4 \Rightarrow x = -1 \\ 4y = 12 \Rightarrow y = 3 \end{cases} \quad T(-1, 3) = (4, 12)$$

نگاشت یک به یک:

نگاشت خطی $f: IR^2 \rightarrow IR^2$ یک به یک است هرگاه f بردارهای (نقاط) متمایز IR^2 را به بردارها (نقاط) متمایز از IR^2 نظیر کند، یعنی به ازای v_1, v_2 از IR^2 اگر $v_1 \neq v_2$ آنگاه $f(v_1) \neq f(v_2)$ باشد یا به عبارت دیگر اگر $f(v_1) = f(v_2)$ آنگاه $v_1 = v_2$. یعنی در نگاشت یک به یک $M: D \rightarrow R$ هر عضو R حداکثر می‌تواند تصویر یک عضو D باشد.

تبدیلات هندسی:

نگاشت‌های خاصی که آن‌ها را تبدیل می‌نامیم، حرکت‌هایی را در هندسه توصیف می‌کنند.

تبدیل، نگاشتی یک به یک از صفحه به روی خودش است. $(M: IR^2 \rightarrow IR^2)$

در تبدیل، هر نقطه در صفحه، تصویر یک نقطه از صفحه است و هیچ دو نقطه‌ای دارای یک تصویر نیستند.

شرط ریاضی تبدیل بودن یک نگاشت $M: IR^2 \rightarrow IR^2$ را می‌توان به این صورت بیان کرد:

$$T(x_1, y_1) = T(x_2, y_2) \Rightarrow (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \quad \text{یا} \quad (x_1, y_1) \neq (x_2, y_2) \Rightarrow T(x_1, y_1) \neq T(x_2, y_2)$$

مثال: کدام نگاشت یک تبدیل است؟

$$T(x, y) = (x - y, x - y) \quad (۲)$$

$$T(x, y) = (x, x) \quad (۴)$$

$$T(x, y) = (x, 0) \quad (۱)$$

$$T(x, y) = (2x - 1, y) \quad (۳)$$

کحل: گزینه ۳ صحیح است.

با یافتن مثال نقض می توان ثابت کرد که گزینه های «الف» و «ب» و «د» یک به یک نیستند. اما گزینه ی «ب» یک به یک است زیرا:

$$T(x_1, y_1) = T(x_2, y_2) \Rightarrow (2x_1 - 1, y_1) = (2x_2 - 1, y_2) \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 - 1 = 2x_2 - 1 \Rightarrow x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \end{cases} \Rightarrow (x_1, y_1) = (x_2, y_2)$$

بقیه گزینه ها یک به یک نیستند:

$$T(x, y_1) = T(x, y_2) = (x, 0)$$

$$T(x_1, x_1) = T(y_1, y_1) = (0, 0)$$

$$T(x, y_1) = T(x, y_2) = (x, x)$$

تبدیل ایزومتري:

تبدیلی که فاصله ی بین نقطه ها را حفظ کند ایزومتري نامیده می شود.

مثال: اگر تبدیل $T(x, y) = (ax + by, bx - ay)$ ایزومتري باشد، کدام رابطه درست است؟

$$a + b = 1 \quad (۴)$$

$$a^2 - b^2 = 1 \quad (۳)$$

$$a^2 + b^2 = 1 \quad (۲)$$

$$a - b = 1 \quad (۱)$$

کحل: گزینه ۲ صحیح است.

این تبدیل مبدأ را به مبدأ می نگارد، یعنی $T(0, 0) = (0, 0)$ لذا کافی است فاصله یک نقطه دلخواه از صفحه را از مبدأ، با فاصله تصویرش از مبدأ برابر قرار دهیم.

$$\bar{A}(x, y) \Rightarrow |\overline{OA}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\bar{A}(ax + by, bx - ay) \Rightarrow |\overline{OA}| = \sqrt{(a^2 + b^2)(x^2 + y^2)} \Rightarrow a^2 + b^2 = 1$$

نمایش ماتریسی تبدیلات هندسی:

یکی از مهمترین ویژگیهای تبدیلات هندسی خطی آنست که می توان آنها را با ماتریس نیز معرفی کرد. ماتریس نظیر تبدیل

$$T(x, y) = (ax + by, cx + dy) \text{ عبارت است از: } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ همچنین اگر تبدیل } T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ با ماتریس } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ بیان}$$

شود، تبدیل یافته ی هر نقطه به مختصات (x, y) از صفحه ی \mathbb{R}^2 توسط T نقطه ای مانند (x', y') است که:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$$

مثال: اگر تبدیل یافته نقطه ی $(1, -1)$ تحت ماتریس $\begin{bmatrix} 1 & b \\ a & -1 \end{bmatrix}$ نقطه ی $(2, 3)$ باشد، $a + b$ کدام است؟


کحل:

$$\begin{bmatrix} 1 & b \\ a & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 1 - b = 2 \Rightarrow b = -1 \\ a + 1 = 3 \Rightarrow a = 2 \end{cases} \Rightarrow a + b = 1$$

مثال: تبدیل یافته متوازی الاضلاع که رئوس آن $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \end{bmatrix}$ است، تحت ماتریس $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ کدام چهارضلعی می باشد؟
 که حل:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

که مختصات رئوس یک مستطیل است.



تبدیل‌های متوالی:

یک تبدیل خطی $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ را ممکن است به صورت ترکیب تبدیل‌های خطی T_1, \dots, T_n بیان کنیم. یعنی $T(x) = T_n(T_{n-1}(\dots T_2(T_1(x))\dots))$. اگر تبدیل‌های T_1, \dots, T_n دارای ماتریسهای A_1, \dots, A_n باشد، ماتریس تبدیل T حاصل ضرب آن ماتریس‌ها خواهد بود: $A = A_n A_{n-1} \dots A_2 A_1$

تبدیل وارون:

اگر تبدیل خطی $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ وجود داشته باشد، آن گاه نگاشت $T^{-1}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ نیز یک تبدیل خطی است، که آن را وارون نگاشت T می‌نامیم. در این صورت داریم: $T^{-1} \circ T(x, y) = I$ ، $T \circ T^{-1}(x, y) = I$ که I تبدیل همانی است یعنی:

$$I(x, y) = (x, y)$$

اگر تبدیل T دارای ماتریس A باشد، تبدیل T^{-1} دارای ماتریس A^{-1} می‌باشد.

مثال: وارون تبدیل $T(x, y) = (5x + 2y, 7x + 3y)$ کدام است؟

که حل:

راه حل اول:

$$T(x, y) = (X, Y) \Rightarrow T^{-1}(X, Y) = (x, y) \Rightarrow \begin{cases} X = 5x + 2y \\ Y = 7x + 3y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3X - 2Y \\ y = -7X + 5Y \end{cases} \Rightarrow T^{-1}(X, Y) = (3X - 2Y, -7X + 5Y)$$

راه حل دوم:


$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -7 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow T^{-1}(x, y) = (3x - 2y, -7x + 5y)$$

تبدیلات هندسی مهم:

الف) انتقال:

انتقال تبدیلی است که تحت آن همه‌ی نقطه‌های صفحه، به یک فاصله و در یک جهت جابجا می‌شوند. تبدیل $T_{(h,k)}(x, y) = (x + h, y + k)$ به ازای هر دو عدد حقیقی ثابت h, k نشان دهنده یک انتقال است.

در انتقال همه‌ی نقاط صفحه به اندازه‌ی یک بردار ثابت و در جهت بردار ثابت منتقل می‌شوند. (لذا تبدیل انتقال فقط دارای یک بردار ثابت است.)



ویژگی‌های انتقال:

(۱) بردارهایی که هر نقطه را به نقطه‌ی تصویرش نظیر می‌سازند، دارای طول‌های مساوی و جهت‌های یکسان هستند.

(۲) انتقال طول پاره‌خط را حفظ می‌کند.

(۳) انتقال شیب خط را حفظ می‌کند.

(۴) انتقال یک ایزومتري است.

(۵) نتیجه هر چند انتقال متوالی خود یک انتقال است.

مثال: اگر خط D' تصویر خط D در اثر انتقال با بردار $\vec{v} = (2, 0)$ و Δ' تصویر خط Δ در اثر انتقال با بردار $\vec{v} = (0, 3)$ باشد،

از تقاطع این چهار خط کدام شکل ساخته می‌شود؟

- (۱) الزاماً مستطیل (۲) الزاماً مربع (۳) الزاماً لوزی (۴) متوازی الاضلاع


حل: گزینه ۴ صحیح است.

شکل حاصل بستگی به وضعیت خطهای Δ, D نسبت به هم دارد و بنابر این در حالت کلی با توجه به اینکه $D' \parallel D$ و $\Delta' \parallel \Delta$ است، چهارضلعی حاصل متوازی الاضلاع است.

مثال: دایره‌ی $C(O, R)$ حول یک نقطه خود به نام A که نقطه ثابتی است حرکت می‌کند. مکان هندسی نقطه‌ی تماس این

دایره با مماس‌های موازی با امتداد ثابت Δ کدام است؟

Δ ————— Δ —————



(۱) دایره است به مرکز A و به شعاع R .

(۲) دو دایره به شعاع R است که از A می‌گذرند.

(۳) دایره است به مرکز O و به شعاع $2R$.

(۴) خطی است موازی با امتداد ثابت Δ .

حل: گزینه ۲ صحیح است.

اولاً چون دایره حول A حرکت می‌کند، مکان هندسی O یک دایره به مرکز A و به شعاع R است. اگر d موازی با Δ و مماس بر دایره

C باشد، OM برداری است عمود بر Δ به اندازه R پس M انتقال یافته O است، با اندازه بردار OM .

بنابر این مکان هندسی M انتقال یافته مکان هندسی O است. همچنین مکان هندسی N انتقال یافته مکان O با بردار ON است. در

نتیجه مکان مزبور دو دایره به شعاع R که از A می‌گذرند می‌باشد.

ب) بازتاب (تقارن):


۱) بازتاب نسبت به خط:

به ازای هر خط L در صفحه، بازتاب نسبت به خط L ، تبدیلی است که تحت آن تصویر هر نقطه Q که روی خط L نباشد،

نقطه‌ای مانند Q' است، بطوریکه خط L عمود منصف QQ' باشد. همچنین تصویر نقطه P که روی خط L می‌باشد، خود آن نقطه

می‌باشد. خط L محور تقارن بازتاب نامیده می‌شود. بازتاب نسبت به خط L را با $A_L(x, y)$ نمایش می‌دهیم.

برای مثال:



ها $A_{y=x}(x, y) = (x, -y)$ بازتاب نسبت به محور x

ها $A_{x=-}(x, y) = (-x, y)$ بازتاب نسبت به محور y

$A_{y=x}(x, y) = (y, x)$ بازتاب نسبت به نیمساز ربع اول و سوم

$A_{y=-x}(x, y) = (-y, -x)$ بازتاب نسبت به نیمساز ربع دوم و چهارم

(۲) بازتاب نسبت به نقطه:

به ازای هر نقطه P در صفحه بازتاب نسبت به نقطه P ، نگاشتی است که تحت آن هر نقطه‌ی Q در صفحه روی نقطه‌ای مانند Q' طوری نگاشته می‌شود که Q و P و Q' روی یک خط راست باشند و $PQ = PQ'$ ، نقطه‌ی P مرکز تقارن این بازتاب نامیده می‌شود. برای مثال ضابطه بازتاب نسبت به مبدأ به صورت روبه‌رو می باشد:

Q P Q'

•-----•-----•

$A_O(x,y) = (-x,-y)$

ویژگیهای کلی بازتاب:

۱- بازتاب طول پاره خط را حفظ می کند.

۲- بازتاب در حالت کلی شیب خط را حفظ نمی‌کند. (بازتاب نسبت به نقطه شیب را حفظ می‌کند و بازتاب نسبت به خط شیب را لزوماً حفظ نمی‌کند)

۴- بازتاب یک ایزومتری است.

۳- بازتاب جهت شکل را حفظ نمی‌کند.

مثال: معادله‌ی تبدیل یافته دایره‌ی $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 1$ تحت نگاشت تقارن نسبت به خط $y = x$ چیست؟

حل:

چون قرینه دایره نسبت به خط $y = x$ دایره‌ای به همان شعاع است، کافی است قرینه‌ی مرکز دایره را بدست آوریم:


$$\begin{bmatrix} \cdot & 1 \\ 1 & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -r \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -r \end{bmatrix} \Rightarrow (x-1)r + (y+r)r = 1$$

ویژگیهای خاص بازتاب نسبت به نقطه:

(۱) همه ویژگی‌های دوران را دارد.

(۲) نتیجه‌ی هر دو بازتاب نسبت به دو نقطه‌ی O_1 و O_2 یک انتقال است با بردار $\overrightarrow{O_1O_2}$.

$$\overrightarrow{AA_1} = r\overrightarrow{O_1O_2}$$




۳) نتیجه هر سه بازتاب متوالی نسبت به سه نقطه‌ی غیر واقع بر یک خط راست

O_1, O_2, O_3 ، بازتاب نسبت به نقطه O_4 است.

نقطه O_4 رأس چهارم متوازی الاضلاعی است که سه رأس متوالی آن O_1, O_2, O_3

می باشند.



(۴) ضابطه‌ی تقارن نسبت به نقطه $O(\alpha, \beta)$ برابر است با: $A_O(x, y) = (2\alpha - x, 2\beta - y)$

(۵) اگر خط $\Delta': ax + by + c' = 0$ تصویر خط $\Delta: ax + by + c = 0$ تحت بازتاب نسبت به نقطه O باشد، معادله مکان هندسی

مرکز تقارن (نقطه O) برابر است با: $ax + by + \frac{c+c'}{2} = 0$. این خط، موازی دو خط Δ و Δ' و در وسط آنها واقع است.

مثال: اگر تصویر خط $D: 2x - y + 2 = 0$ در اثر تقارن نسبت به نقطه O خط $D': -2x + y + 2 = 0$ باشد، مکان هندسی ω

کدام است؟

حل:

$$\begin{aligned} 2x - y + 2 &= 0 \\ 2x - y - 2 &= 0 \end{aligned} \Rightarrow 2x - y + \frac{2-2}{2} = 0 \Rightarrow y = 2x$$

مثال: بازتاب خط $x - 2y = 4$ نسبت به نقطه‌ی $(2, a)$ ، خط $x - 2y + 6 = 0$ است. a کدام است؟

کحل:

چون دو خط موازیند. محور تقارن خطی است که بین دو خط و با فاصله مساوی از دو خط قرار دارد.

$$\left. \begin{aligned} x - 2y - 4 &= 0 \\ x - 2y + 6 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow x - 2y + \frac{6-4}{2} = 0 \Rightarrow x - 2y + 1 = 0$$

پس نقطه‌ی $\left| \begin{smallmatrix} 2 \\ a \end{smallmatrix} \right|$ روی خط فوق قرار دارد.


$$2 - 2y + 1 = 0$$

$$\text{لذا } y = \frac{3}{2} \text{ پس } a = \frac{3}{2}$$

ویژگی‌های فاص بازتاب نسبت به خط:

(۱) نتیجه هر دو بازتاب نسبت به دو خط موازی یک انتقال است. بردار این انتقال عمود بر راستای دو خط و اندازه آن دو برابر فاصله بین دو خط است.


$$(A_1 A_2 = 2\vec{L})$$



$$\vec{A_1 A_2} = 2\vec{L}$$

$$\vec{L} = (0, 2) \Rightarrow \vec{A_1 A_2} = 2(0, 2) = (0, 4)$$

انتقال تحت بردار $(0, 4)$



مثال: نتیجه دو بازتاب متوالی نقطه $(3, 3)$ نسبت به خط $y = 2$ و سپس خط $y = 4$ برابر است با:

(۱) بازتاب نسبت به نقطه $(3, 4)$

(۲) انتقال تحت بردار $(0, 4)$

(۳) بازتاب نسبت به خط $y = 4$

(۴) چنین تبدیلی وجود ندارد.

کحل: گزینه ۲ صحیح است.

نتیجه هر دو بازتاب نسبت به دو خط متقاطع، دورانی است به مرکز محل تلاقی دو خط

متقاطع (محور تقارن) و زاویه‌ای مساوی دو برابر زاویه بین دو خط.

(۲) ضابطه‌ی بازتاب نسبت به خط $\Delta: ax + by + c = 0$ عبارتست از:

$$A_{\Delta}(x, y) = \left(x - 2a \times \frac{ax + by + c}{a^2 + b^2}, y - 2b \times \frac{ax + by + c}{a^2 + b^2} \right)$$

مثال: اگر نقطه M' تصویر نقطه $M = (-1, -1)$ در اثر بازتاب نسبت به خط $2x + y - 2 = 0$ باشد، مختصات M' کدام است؟

کحل:

$$M' = A(-1, -1) = \left(-1 - (2 \times 2 \times \frac{-2 - 1 - 2}{5}), -1 - (2 \times 1 \times \frac{-2 - 1 - 2}{5}) \right) \Rightarrow M' = (3, 1)$$

مثال: تحت یک بازتاب نسبت به خط، نقطه‌ی $(-2, 1)$ روی نقطه $(2, 5)$ تصویر می‌شود، تصویر کدام نقطه تحت این بازتاب

نقطه‌ی $(3, 4)$ است؟

(۴) $(-1, 0)$

(۳) $(1, 0)$

(۲) $(0, -1)$

(۱) $(0, 1)$

کحل: گزینه ۴ صحیح است.

چون بازتاب تبدیلی ایزومتري است، پس فاصله‌ی نقطه‌ی $(۲,۵)$ از نقطه‌ی $(۳,۴)$ با فاصله‌ی نقطه‌ی $(-۲,۱)$ از نقطه‌ی ای که تصویرش $(۳,۴)$ است باید برابر باشد که این موضوع فقط در گزینه‌ی ۴ اتفاق می افتد.

۳) اگر خط $\Delta': a'x + b'y + c' = 0$ تصویر خط $\Delta: ax + by + c = 0$ تحت بازتاب باشد، معادلات محورهای تقارن در صفحه،

$$\text{برابر} \frac{ax + by + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \pm \frac{a'x + b'y + c'}{\sqrt{a'^2 + b'^2}} \text{ است. (معادله‌ی نیمسازهای دو خط متقاطع)}$$



مثال: اگر دو خط $x - 2y + 1 = 0$ و $4x + 2y - 1 = 0$ قرینه محوری یکدیگر باشند، محور تقارن کدام است؟

کحل:

$$\frac{4x + 2y - 1}{\sqrt{4 + 16}} = \pm \frac{x - 2y + 1}{\sqrt{1 + 4}} \Rightarrow 4x + 2y - 1 = \pm 2(x - 2y + 1) \Rightarrow 2x + 6y - 3 = 0 \quad 6x - 2y + 1 = 0$$

مرکز تقارن و محور تقارن یک شکل:


اگر برای یک شکل نقطه‌ای مانند O وجود داشته باشد، به گونه‌ای که قرینه‌ی هر نقطه شکل نسبت به O نقطه‌ای از خود شکل باشد، O را مرکز تقارن آن شکل نامند. مثلاً مرکز دایره، مرکز تقارن دایره است. اگر برای یک شکل، خطی مانند Δ وجود داشته باشد، به گونه‌ای که قرینه‌ی هر نقطه‌ی آن شکل نسبت به آن خط، نقطه‌ای از خود شکل باشد، Δ را محور تقارن آن شکل می‌نامند. بعضی از شکل‌ها محور تقارن ندارند. و برخی دیگر دارای یک یا چند محور تقارن هستند. مثلاً متوازی‌الاضلاع محور تقارن ندارد و دایره بی‌شمار محور تقارن دارد.



قضیه: شکلی که دارای دو محور تقارن عمود بر هم باشد دارای مرکز تقارن است.
نکته: n : ضلعی منتظم دارای n محور تقارن است. اگر n فرد باشد مرکز تقارن ندارد و اگر n زوج باشد دارای یک مرکز تقارن است.

۵) دوران:

یک دوران به مرکز O و زاویه α تبدیلی است که هر نقطه A در صفحه را به نقطه‌ای مانند



A' از آن صفحه نظیر می‌کند به گونه‌ای که:

۱) مرکز دوران یعنی نقطه‌ی O ثابت است.

۲) اگر A نقطه‌ای غیر از O باشد، آنگاه $OA = OA'$ و $\angle AOA' = \alpha$ (زاویه دوران)

در دایره‌ای به مرکز O نقطه‌ای مانند P را در نظر گرفته و در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت روی دایره از P به P'

حرکت می‌کنیم بطوریکه $\angle POP' = \alpha$. چون $OP = OP'$ تصویر نقطه‌ی P تحت دوران به مرکز O و اندازه‌ی α است.

اگر α یعنی اندازه زاویه مثبت باشد، دوران در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت است.

ویژگی‌های دوران:

۱) دوران طول پاره‌خط را حفظ می‌کند.

۲) دوران مرکز دوران را ثابت نگه می‌دارد.

۳) دوران الزاماً شیب خط را حفظ نمی‌کند (جز برای $\theta = 180^\circ$ و $\theta = 360^\circ$ و مضارب آن‌ها یعنی $\theta = k\pi$).

۴) دوران یک ایزومتري است.

۵) نتیجه هر چند دوران حول یک مرکز، یک دوران است به همان مرکز و زاویه‌ای مساوی مجموع زاویه‌ها.

(۶) تبدیل یافته نقطه (x, y) ، تحت دوران به اندازه زاویه θ برابر است با: $(x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)$ و لذا: تبدیل

$$R_{\theta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \text{ دوران را با ماتریس مقابل می توان بیان کرد:}$$

که مثلاً برای $\theta = 90^\circ$:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix} \Rightarrow R(x, y) = (-y, x)$$

و برای $\theta = 180^\circ$:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x \\ -y \end{bmatrix} \Rightarrow R(x, y) = (-x, -y)$$

و برای $\theta = 270^\circ$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ -x \end{bmatrix} \Rightarrow R(x, y) = R(y, -x)$$

(۷) دوران به مرکز O و زاویه 180° معادل بازتاب نسبت به نقطه O نیز می باشد. در این حالت نقطه O مرکز تقارن نیز نامیده می شود.

مثال: به ازاء کدام مقدار a نقطه $M' = (a+1, a-1)$ تصویر نقطه $M = (1, 1)$ در اثر دوران با مرکز مبداء مختصات و زاویه

45° است؟

حل:

$$\begin{bmatrix} a+1 \\ a-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a+1=0 \\ a-1=\sqrt{2} \end{cases}$$

برای a جواب وجود ندارد.

مثال: تبدیل $T(x, y) = (-y+1, x-1)$ نتیجه کدام دو تبدیل است؟

(۴) انتقال و تقارن

(۳) دو تقارن محوری

(۲) انتقال و تجانس

(۱) انتقال و دوران

حل: گزینه ۱ صحیح است.

$$T(x, y) = (-(y-1), (x-1))$$

$$T_{(-1, -1)}(x, y) = (x-1, y-1)$$

$$R_{90^\circ} T_{(-1, -1)}(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-1 \\ y-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(y-1) \\ x-1 \end{bmatrix}$$

لذا ترکیب یک انتقال و یک دوران است.


(د) تجانس:

تجانس به مرکز O و نسبت K تبدیلی است که هر نقطه A در صفحه را به نقطه ای مانند A' از آن صفحه طوری نظیر کند که:

(۱) مرکز تجانس یعنی نقطه O ثابت باشد.

(۲) روی نیم خط OA قرار گیرد به طوری که: $OA' = K.OA$

تحت تجانس همه ی ابعاد یک شکل به نسبت تجانس بزرگ یا کوچک می شود. (مگر در حالت $k=1$)



مثال: اگر در تجانس به مرکز $\omega = (-2, 3)$ تصویر خط $x - 5y + 1 = 0$ خط $x - 5y - 3 = 0$ باشد، قدرمطلق نسبت تجانس کدام است؟

کحل:


چون ω مرکز تجانس است، پس باید فاصله ω از D' ، $|k|$ برابر فاصله ω از D باشد.

$$\omega H' = |k| \omega H \Rightarrow \frac{|-2-15-3|}{\sqrt{1+25}} = |k| \times \frac{|-2-15+1|}{\sqrt{1+25}} \Rightarrow 20 = |k| \times 16 \Rightarrow |k| = \frac{5}{4}$$

فابطه‌ی تبدیل تجانس:

تبدیل $D(x, y) = (kx, ky)$ در صفحه مختصات یک تجانس با نسبت تجانس k و مرکز تجانس $(0, 0)$ را نشان می‌دهد.

اگر $k > 1$ باشد، تجانس یک انبساط و اگر $0 < k < 1$ باشد، تجانس یک انقباض نام دارد. حالت $k < 0$ تجانس معکوس نامیده می‌شود.



ویژگی‌های تجانس:

(۱) تجانس شیب خط را حفظ می‌کند.

(۲) تحت تجانس مرکز تجانس ثابت می‌ماند.

(۳) تجانس طول یا مساحت را حفظ نمی‌کند (مگر در حالتی که $k = 1$).

(۴) تجانس طول را با ضریب k و مساحت را با ضریب k^2 تغییر می‌دهد.

(۵) خط‌هایی که نقطه‌های نظیر را به هم وصل می‌کنند در مرکز تجانس هم‌رسند.

(۶) نتیجه دو تجانس هم مرکز با نسبت‌های k و k' تجانسی است با همان مرکز و نسبت kk' .


(۷) ماتریس تبدیل تجانس با نسبت تجانس k و مرکز $(0, 0)$ برابر است با: $\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$

(۸) مجانس نقطه‌ی A به مرکز S و نسبت K نقطه A' است که $A' = kA + (1-k)S$.

$$SA' = KSA \rightarrow (A' - S) = K(A - S) \Rightarrow A' = KA + (1 - K)S$$

(۹) هر دو دایره مجانس یکدیگرند (هم مستقیم و هم معکوس). مرکز تجانس نقطه‌ای است واقع بر خط‌المرکزین (یا امتداد آن) که خط‌المرکزین را به نسبت دو شعاع تقسیم می‌کند.

اگر C' تصویر C باشد:



$$k = \frac{R'}{R} \quad (C' \text{ تصویر } C) \quad S \equiv \text{مرکز تجانس مستقیم}$$


$$k = -\frac{R'}{R} \quad (C' \text{ تصویر } C) \quad S' \equiv \text{مرکز تجانس معکوس}$$

تذکر: اگر دو دایره متساوی باشند، فقط مجانس معکوس یکدیگرند و در این حالت $k = -1$ است.

مثال: O, O' مرکزهای دو دایره به شعاعهای ۵، ۳ سانتی‌متر است. اگر $OO' = 12 \text{ cm}$ باشد، فاصله مرکز تجانس معکوس این


دو دایره از مرکز دایره با شعاع بزرگتر چند سانتی‌متر است؟

کحل:



$$\left. \begin{aligned} \frac{FO'}{FO} = \frac{5}{3} &\Rightarrow FO = \frac{3}{5}FO' \\ FO + FO' = OO' = 12 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{3}{5}FO' + FO' = 12 \Rightarrow \frac{8}{5}FO' = 12 \Rightarrow FO' = \frac{60}{8} = 7.5$$

مثال: در مثلث ABC دو رأس C, B ثابت و رأس A بر روی دایره‌ی مفروض C(O,R) تغییر می‌کند، مکان هندسی مرکز ثقل مثلث کدام است؟
 کحل:



چون مرکز ثقل مثلث محل تلاقی میانه‌های مثلث است، پس همواره داریم: $MG = \frac{1}{3}MA$ ، یعنی G مجانس A است به مرکز M و نسبت $\frac{1}{3}$ (M ثابت است، چون وسط C, B است). پس مکان هندسی G مجانس مکان هندسی A با نسبت $\frac{1}{3}$ می‌باشد، یعنی دایره‌ای به شعاع $\frac{R}{3}$.

مثال: ترکیب دو تقارن محوری که محورهای آن دو بر هم عمود باشند، کدام تبدیل نمی‌تواند باشد؟

- (۱) انتقال (۲) تجانس (۳) تقارن مرکزی (۴) دوران


کحل: گزینه ۱ صحیح است.

ترکیب دو تقارن با محورهای متقاطع یک دوران با زاویه‌ای برابر دو برابر زاویه بین دو خط است لذا دورانی به اندازه $2 \times 90^\circ = 180^\circ$ داریم که یک تقارن مرکزی است. تقارن مرکزی نسبت به نقطه تقاطع، تجانس با ضریب $k = -1$ نیز هست.

جمع‌بندی و نکات مشترک تبدیلات:

(۱) طول پاره‌خط و اندازه‌ی زاویه، تحت انتقال، دوران و بازتاب ثابت می‌ماند.


(۲) اگر دو خط موازی باشند، هر یک از آنها می‌تواند تحت یک انتقال، دوران 180° یا بازتاب بر روی دیگری نگاشته شود.




(۳) یک خط می‌تواند تحت یک انتقال، دوران 180° یا بازتاب بر روی خودش نگاشته شود.



(۴) عمود منصف هر پاره‌خط AB محور تقارن بازتابی است که $A \rightarrow B$ و $B \rightarrow A$.



(۵) اگر دو خط متقاطع باشند، هر یک از آنها می‌تواند تحت یک دوران یا بازتاب بر روی دیگری نگاشته شود.



مثال: اگر خط $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ تصویر خط $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ در اثر یک دوران باشد، زاویه دوران کدام است؟

حل:

می‌توان دو خط را دوران یافته یکدیگر حول نقطه تقاطعشان در نظر گرفت. لذا کافی است زاویه بین دو خط را به عنوان زاویه دوران به دست آوریم:


$$\tan \theta = \left| \frac{m - m'}{1 + mm'} \right| = \left| \frac{\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + 1} \right| = \left| \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}}{2} \right| = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \theta = 30^\circ$$

اگر دو خط را دوران یافته یکدیگر حول نقطه‌ای بیرون دو خط در نظر بگیریم، که در این صورت زاویه دوران برابر است با: 150°

مثال: دو خط Δ و Δ' و نقطه‌ی A خارج آن‌ها مفروض‌اند، برای رسم مثلث قائم‌الزاویه و متساوی‌الساقین با رأس A که دو سر قاعده‌ی آن بر روی هر دو خط مفروض باشد، کدام تبدیل به کار می‌رود؟

حل:

ابتدا خط Δ را به اندازه‌ی 90° حول نقطه‌ی A دوران می‌دهیم تا خط Δ' را در نقطه‌ی C قطع کند.



چون تبدیل دوران ایزومتري است، پس فاصله بین نقاط را حفظ می‌کند. لذا به ازای نقطه‌ی C روی خط دوران یافته نقطه‌ای روی Δ مانند B وجود دارد که فاصله اش از پای عمود با فاصله C از پای عمود برابر است. حال چون C دوران یافته‌ی B است و شعاع دوران در اثنای دوران ثابت می‌ماند، پس مثلث ABC قائم‌الزاویه‌ی متساوی‌الساقین است. و مثلث مورد نظر رسم شد.

این ایده همواره برای رسم مثلث‌های متساوی‌الساقین با رأس معلوم که دو رأس دیگرشان روی خطوط معلوم قرار داشته باشند، به کار می‌رود.

مثال: سه خط d, d', d'' در یک صفحه مفروضند. چند مثلث متساوی‌الاضلاع می‌توان رسم کرد به طوریکه هر کدام از رؤس آن بر یکی از خط‌های d, d', d'' باشد؟


حل:

طبق ایده‌ی مثال فوق نقطه‌ای روی یکی از خطوط اختیار کرده و مثلث متساوی‌الساقینی با زاویه‌ی رأس 60° درجه که دو رأس دیگر آن روی دو خط دیگر باشد، رسم می‌کنیم تا مثلث متساوی‌الاضلاع به دست آید.

مثال: در یک صفحه، دو دایره به شعاع‌های متفاوت در نقطه‌ی A متقاطع‌اند. با استفاده از کدام تبدیل می‌توان از نقطه‌ی A خطی گذراند که در این دو دایره، وترهای مساوی ایجاد کند؟

حل:

اگر دایره‌ی کوچکتر را نسبت به نقطه‌ی A (نقطه‌ی تقاطع دو دایره‌ی کوچک و بزرگ) بازتاب دهیم،




دایره‌ی خط‌چین به دست می‌آید. واضح است که $AB = AB'$ زیرا نقطه‌ی B' بازتاب نقطه‌ی B نسبت

به مرکز A است.

از طرفی AB' وترى از دایره‌ی بزرگتر است، بنابراین از نقطه‌ی A خطی گذرانده شده (خط BB') که در دو دایره‌ی بزرگ و کوچک، وترهای مساوی جدا کرده است (وتر AB در دایره‌ی کوچک = وتر AB' در دایره‌ی بزرگ) پس گزینه‌ی (۴) (یعنی بازتاب نسب به نقطه‌ی A) ما را به مقصود رسانده است. اما هر بازتاب مرکزی یک دوران 180° هم هست. به عبارت دیگر دوران 180° نسبت به نقطه‌ی A هم همین نتیجه را می‌دهد.

مثال: دو خط متقاطع d و d' و پاره خط AB غیر موازی با d و d' ، در صفحه‌ی آن‌ها مفروض است. برای رسم پاره خطی موازی و مساوی AB که دو سر آن بر روی این دو خط باشد، کدام تبدیل هندسی به کار می‌رود؟

حل:



دو خط d و d' پاره خط AB مفروض‌اند. هرگاه خط d را تحت \overline{AB} و خط d' را تحت \overline{BA} انتقال دهیم یک متوازی‌الاضلاع حاصل می‌گردد. قطری که دو سر آن روی خطوط d و d' قرار دارد، مساوی و موازی پاره خط AB است. تذکر: می‌توانستیم خط d را تحت \overline{BA} و خط d' را تحت \overline{AB} انتقال دهیم. در این حالت نیز متوازی‌الاضلاعی دیگر حاصل می‌شود که قطری از آن که دو سر آن روی خطوط d و d' قرار دارد، مساوی و موازی پاره خط AB است.

روش یافتن تبدیل یافته هر منحنی دلفواه تحت یک تبدیل:

ابتدا یک نقطه پارامتری دلفواه $A = (x, y)$ روی منحنی در نظر گرفته و تبدیل را بر آن اعمال می‌کنیم تا نقطه $A' = (X, Y)$ به دست آید. سپس x و y را بر حسب Y, X پیدا کرده و در منحنی اولیه جایگذاری می‌کنیم. معادله‌ی حاصل تبدیل یافته منحنی تحت تبدیل مورد نظر است.

مثال: تبدیل یافته منحنی $x^2 + y^2 = 1$ تحت تبدیل $f(x, y) = (3x, 2y)$ کدام است؟

حل:

ابتدا نقطه $A = (x, y)$ را روی منحنی در نظر می‌گیریم.

$$f(x, y) = (X, Y) = (3x, 2y) \Rightarrow x = \frac{X}{3}, y = \frac{Y}{2} \Rightarrow \left(\frac{X}{3}\right)^2 + \left(\frac{Y}{2}\right)^2 = 1 \Rightarrow \frac{X^2}{9} + \frac{Y^2}{4} = 1$$

این تبدیل دایره را به بیضی تبدیل می‌کند.

مثال: تصویر خط $y = x - 8$ تحت تقارن نسبت به محور x ‌ها کدام است؟

حل:

$$A = (x, y) \Rightarrow R(x, y) = (x, -y) \Rightarrow X = x, Y = -y \Rightarrow y = -Y \Rightarrow -Y = x - 8 \Rightarrow Y = -x + 8$$

مؤسسه آموزشی فرهنگی